

Motion efter bypassoperation



Motion är bra för återhämtningen

Du har nyligen genomgått en bypassoperation. Det tar 2–3 månader för bröstbenet att förbenas och din kropp har återhämtat sig från operationen. Fysisk träning är en viktig del av din rehabilitering. Du kan påskynda återhämtningen och återställa din funktionsförmåga genom att vara fysiskt aktiv. Fysisk träning förbättrar

andningen, hjärtats förmåga att tåla påfrestning och blodcirkulationen i kroppen. Motion är avslappnande och ger positiva upplevelser av att orka mer och må bra. Det hjälper att klara av vardagen bättre. Så småningom kommer du att märka att det är lättare att motionera än före operationen.

Bilder Anna Kara, om inte annat anges



På fötter redan på sjukhuset

Fysisk aktivitet bidrar till din återhämtning efter operationen och det krävs att du är aktiv för att rehabiliteringen ska gå smidigt. På intensivvårdsavdelningen har du fått anvisningar för god andnings- och hostningsteknik och du har fått handledning i andningsövningar och metoder för att lösgöra slem. Du vet hur du sätter dig upp så att det är tryggt för bröstbenet. Du har vant dig vid att vara upprätt och övar på att stiga upp och stå.

På bäddavdelningen är det viktigt att du börjar röra på dig genast i enlighet med personalens anvisningar. När du ligger ner ska du aktivt göra pumpande rörelser med tårna, vristerna och knäna för att aktivera blodcirkulationen och förhindra trombosor.

Du bör motionera aktivt dagligen även om du nu i början ska se till att ansträngningen är lätt (RPE 11–12, se sid. 9). Sträva efter att sköta dina

dagliga funktioner själv och motionera armar och överkropp på egen hand enligt anvisningar. Promenera omkring på avdelningen och undan för undan även i andra delar av sjukhuset. Gör andningsövningar. När du rör på dig märker du att det går bra och är tryggt. Samtidigt lär du dig småningom att motionera längre och öka belastningen till ganska ansträngande (RPE 13–14). Innan du får fara hem får du vid behov prova på att gå i trappor med en fysioterapeut.

När du träffar fysioterapeuten och ni talar om din träning kan ni tillsammans göra upp en motionsplan för dig. Med hjälp av den planerar du hur och när du vill motionera framöver. Med hjälp av en motionsdagbok kan du följa med hur planen förverkligas.

Hela personalen på avdelningen hjälper dig att motionera. Om du har svårt att slappna av kan du be fysioterapeuten om tips på avslappningsmetoder.

Särskilda råd för sjukhusmotion

De första månaderna hemma

DEN FÖRSTA MÅNADEN HEMMA

KOM IGÅNG

Hjärtat återhämtar sig från sin bypass-operation och därför gäller det för dig att komma ihåg vissa saker under din konvalescens. Vardagssysslor är den bästa rehabiliteringen efter operationen. Hemma är det bra att komma igång med vardagen med lätt hushållsarbete och lugn motion (RPE 11–12). Förbered din kropp och ditt hjärta på den förestående ansträngningen och börja med att värma upp i 5–15 minuter. Trampa motionscykel eller gå på promenad flera gånger om dagen. Undan för undan kan du öka distansen och till slut farten. När du börjar med uppvärmning och avslutar med nedvarvning blir det behagligare att motionera. Det lindrar också effekten av hjärtmediciner, t.ex. betablockrare, som gör att pulsen stiger långsammare när man motionerar.

HUR DET KÄNNS MEDAN DU MOTIONERAR

Du får bli lätt andfådd medan du motionerar och det är okej om det känns ganska ansträngande (RPE 13–14). Dina känningar vid fysisk ansträngning är viktiga när du bedömer vad som är lagom intensiv nivå. Ta RPE-skalan till din hjälp. Med hjälp av den kan du bedöma hur tungt det känns att motionera. Ett bra mått är om du kan motionera och prata samtidigt utan att flåsa eller få andra symtom. Kom ihåg att symtom som bröstsmärta och andnöd inte hör till när man motionerar. Utmattning eller trötthet utöver det normala kan vara tecken på att ansträngningen är för stor. Det ska kännas bra både under och efter träningspasset. När motionspasset är över ska andningen ska du sluta vara andfådd. Genom att lyssna på din kropp lär du dig motionera tryggt och effektivt.

Särskilda råd för motion hemma

ANDNINGSOVNINGAR HEMMA

Fortsätt hemma med de andningsövningar som du har lärt dig på sjukhuset tills andningen löper fritt och slembildningen har minskat. Fysisk aktivitet varje dag förbättrar andningen och lungfunktionen. Det är lättare att hosta om du stöder bröstkorgen med händerna och en kudde.

GOD HÅLLNING

Mjuka upp musklerna i axlarna och bröstkorgen med de gymnastikövningar som du fick med dig från sjukhuset. När det spänner och gör ont i operationssåret kan det hända att din hållning ändras, så var uppmärksam på kroppshållningen i olika situationer. Slappna av i axlarna och försök röra armarna normalt när du går. Att gymnastisera hemma hjälper dig att få bättre hållning och göra överkroppen och armarna mer rörliga.

BENBILDNING I BRÖSTBENET


Ossifikation (benbildningen) av bröstbenet tar 2–3 månader. Dagliga hushållssysslor som att laga mat stör inte processen. Undvik ändå att rycka till med armarna och överkroppen, hastiga ansträngningar eller att lyfta och bära något tungt, utan låt bröstbenet läka i fred. Under den första månaden får du lyfta och bära bördor som väger _____ kilo. Om smärtan tilltar vi lyft är det ett tecken på att ansträngningen är för stor.

ANDRA MÅNADEN HEMMA

Nu kan du öka effekten på din motion. Sträva efter att röra på dig minst 15–45 minuter 1–2 gånger dagligen. Det får kännas ansträngande eller ganska ansträngande (RPE 13–15). Fortsätt gymnastisera dagligen. Nu får du lyfta och bära bördor som väger _____ kilo. Du kan promenera och träna på motionscykel, men du kan också stavgå lugnt och röra dig i naturen. Simning, cykling och hurtigare stavgång får vänta på att bröstbenet har förbenats.

NÄR BRÖSTBENET ÄR FÖRBENAT

När det har gått 2–3 månader sedan bypassoperationen borde det kännas betydligt lättare att motionera än när du kom hem från sjukhuset. Skidåkning och andra motionsformer som kräver större armrörelser är nu tillåtna. Från och med nu kan du sköta din kranskärslsjukdom genom att motionera regelbundet.



Motion är en väsentlig del av vården av kranskärlssjukdom

Vid sidan av medicinering är motion, hjärtvänlig mat, viktkontroll, mentalt välmående, tillräcklig sömn och rökfrihet hörnstenarna i vården av kranskärlssjukdom. Du har nu en fin chans att påverka din kranskärlssjukdom genom att motionera. Visste du att regelbunden motion kan påverka riskfaktorer som förvärrar kranskärlssjukdom och till och med bromsa upp sjukdomens fortskridande? Det lönar sig alltid att börja motionera.

Regelbunden motion

- förbättrar hjärtats pumpkraft och förmåga att klara av påfrestning
- förbättrar hjärtats och cirkulationsorganens kondition

- gör att det innersta skiktet (intima) i artärerna fungerar bättre och bidrar till att nya ådror bildas
- ökar det goda HDL-kolesterolet och minskar det onda LDL-kolesterolet så att förträngningar i artärerna uppstår långsammare
- minskar triglyceridhalten i blodet
- sänker blodtrycket vid vila
- hjälper vid viktkontroll
- ökar kroppens insulinkänslighet och förbättrar blodsockerbalansen
- utvecklar muskelstyrkan
- är uppiggande

→ höjer livskvaliteten, ger mer ork i vardagen och förbättrar sjukdomsprognosen



Med motion som livsstil

Det är viktigt att man motionerar regelbundet och därför borde motionen vara en del av vardagen alla dagar. Om din kondition har blivit sämre eller du rör på dig begränsat ska du börja försiktigt och öka stegvis mängd och takt. Du kan samla din dagliga dos motion av flera korta motionspass. I takt med att konditionen höjs kan du öka mängden till 30–60 minuter per dag och först sedan öka tempot. Takten är lagom intensiv när den motsvarar en rask promenad. Det är dessutom bra om du blir andfådd.

Den dagliga motionen kan bestå av vardagsmotion, exempelvis att cykla till och från jobbet, arbeta i trädgården och satsa på uthållighetsträning som får upp flåset en aning (RPE 13–14, se sid. 5). Om du är i god form och motionen inte ger dig några symptom kan du röra dig på en ansträngande nivå (RPE 15–16). I början kan du prova på pass med högre intensitet i intervaller, så att du ökar pressen då och då men tar det lugnare däremellan.

Bra motionsformer för uthållighetsträning är promenader, golf, att röra sig i naturen, motionscykling, skidåkning, simning, stavgång, joggning, dans, rodd och olika bollspel. Välj gärna motionsformer som du tycker om. Bättre uthållighet gör vardagen lättare och det blir lättare att träna och röra på sig.

Det är viktigt att också träna musklerna minst två gånger i veckan. Du kan stärka musklerna på många olika sätt hemma, på gym eller i naturen. Fokusera dina övningar i muskelstyrka på att träna de stora muskelgrupperna som är viktiga för din funktionsförmåga. De stora musklerna i benen är viktiga för rörelseförmågan. God muskelstyrka gör det lättare att klara av många vardagssysslor och det blir allt viktigare med åldern.

SÅ LYCKAS DU

- Utnyttja alla tillfällen till vardagsmotion.
 - Slå fast ett mål: 30–60 minuter hurtig motion per dag och muskelkraftövningar 2 ggr i veckan.
-

Rör dig modigt men lyssna på din kropp

Hur det känns i den egna kroppen är viktigt när man bedömer hur effektivt man motionerar. Det är tillåtet och till och med bra att bli andfådd. Ett motionspass är lämpligt belastande när det inte ger symtom, inte gör en utmattad och man känner sig uppiggad efteråt. Det är viktigt att du inser skillnaden mellan att bli andfådd och att få andnöd. Att man blir andfådd hör till när man motionerar och ju tyngre motion, desto mer andfådd blir du. Andnöd eller andtäppa känns otrevligt och lättar inte med vila. Genom att lyssna på din kropp lär du dig motionera tryggt och effektivt. Med hjälp av RPE-skalan kan du bedöma hur tungt det känns att motionera.

Utmattning eller trötthet utöver det normala kan vara ett tecken på att ansträngningen är för stor. Det ska inte ta längre tid att återhämta sig än

vad själva träningen har pågått. En del hjärtmediciner, bland annat betablockerare, gör att pulsen stiger långsammare under fysisk aktivitet. Då känns det trevligare att motionera om du börjar i långsam takt eller ser till att uppvärmningen är tillräckligt lång (5–15 minuter) och avslutar med nedvarvning.

Mediciner gör det möjligt att motionera genom att lindra symtom, effektivisera syreupptagningen i hjärtmuskulaturen och förbättra belastningstoleransen. Bröstmärta, andnöd, smärta i övre buken och illamående vid fysisk ansträngning är typiska symtom på kranskärlssjukdom. Om du får symtom till exempel i en uppførsbacke ska du dra ner på farten, vila och vid behov ta en snabbverkande nitroglycerintablett. Sök vård om besvären inte försvinner snabbt efter vila och en nitrotablett.



RPE-skalan

Den här tabellen hjälper dig att bedöma hur ansträngande ditt motionspass känns. Siffrorna anger den upplevda graden av andfåddhet och total belastning.



| HUR ANSTRÄNGANDE KÄNNS FYSISK TRÄNING? | |
|--|--------------------------|
| 6 | nästan inte alls andfådd |
| 7 extremt lätt | |
| 8 | |
| 9 mycket lätt | |
| 10 | en aning andfådd |
| 11 lätt / det går att sjunga | |
| 12 | |
| 13 ganska ansträngande / det går att prata | |
| 14 | mycket andfådd |
| 15 ansträngande / gör att man flåsar | |
| 16 | |
| 17 mycket ansträngande | |
| 18 | |
| 19 extremt ansträngande | |
| 20 | |

RPE-skalan (Rating of Perceived Exertion), modifierad efter Borgskalan (1982)

Vilken slags motion tycker du om?

Kranskärllssjukdom hindrar aldrig all motion. Planera din vecka och reservera tid för att motionera regelbundet. Tänk igenom hur du kan göra motion till en permanent del av din vardag. Ta dig tid att tänka på din motionshistoria och dina vanor. Gör upp en motionsplan och för motionsdagbok. Det finns många bra sätt att motionera. Tänk igenom om du trivs bäst med motion i sällskap eller ensam. Rör du dig hellre i naturen? Blir fysisk aktivitet lättare en vana om du kommer överens om att till exempel gå på promenad med en vän eller anhörig? Målet är att du ska hitta tider och sätt att motionera som passar just dig. De positiva upplevelser som fysisk aktivitet ger hjälper dig att motionera regelbundet.

Prata med din fysioterapeut, hälsovårdare eller en stödperson om det känns skrämmande eller ångestfyllt att motionera. Du kan också delta i gruppträning eller motionsinriktad rehabilitering. Be din behandlande läkare i så fall skriva en remiss.

MINNESHJÄLP FÖR DIG SOM TRÄNAR

- Börja med uppvärmning (5–15 minuter) och avsluta med nedvarvning.
 - Öka intensiteten allt efter hur träningen känns.
 - Du får bli andfådd, det är bara bra.
 - Tänk på att det ska kännas bra både under och efter träningspasset.
 - Fråga din läkare hur fysisk aktivitet påverkas av dina mediciner.
 - Ta det lugnare om väderförhållandena är speciellt krävande.
 - Ha nitrotabletter med dig. Ta en nitrotablett och vila om du får besvär. Fortsätt i lugnare takt när besvären avklingat.
 - Sök vård vid kraftiga symtom.
 - Din hälsa förbättras när du motionerar regelbundet.
-


Tänk igenom hur du kan göra motion till en permanent del av din vardag. Ta dig tid att tänka på din motionshistoria och dina vanor.

Stöd för motionen

Det finns stöd av olika slag för att hjälpa dig att röra på dig. Vid behov får du personliga motionsråd av fysioterapeuten på hälsovårdscentralen, hjärtsjukskötaren, företagshälsovården, din lokala hjärtförening eller ditt hjärtdistrikt eller av en kommunal idrottsinstruktör för grupper med särskilda behov.

Information, kunskap och stöd kring din sjukdom och konkreta tips för motion och hur du kan hantera din sjukdom finns på sidan sydan.fi. På finska finns det mer information på Rehabiliteringshuset.fi → Suomeksi → Kuntoutujalle → Sydänsairaudet. På Hjärtförbundets kurser kommer du åt att träffa andra människor i samma situation och dela erfarenheter kring bland annat motion medan ni lär er tillsammans (sydan.fi/kurssikalenteri). Du kan också fråga om Tulppa-rehabilitering på din egen hälsovårdscentral. Med en stödperson kan du i förtroende tala om motion,

dina upplevelser och känslor (sydan.fi/sv/kamratstod-person-sokning/). På sidorna sydan.fi/sv/kom-med/ hittar du information om Hjärtförbundets verksamhet som du kan delta i. Där finns ett utbud av webbföreläsningar och förbundets händelsekalender och om du vill kan du gå med i en hjärtförening. Du är hjärtligt välkommen med i hjärtföreningens motionsverksamhet.



OM DU VILL HA YRKESKUNNIGT STÖD, TA KONTAKT

Namn

Tfn

E-post

Sex minuters gångtest

Gångdistans _____

Referensvärde _____

Obs!



Råd och anteckningar

Individuella råd

Mina anteckningar

Motionsplan

Följande frågor hjälper dig att tänka på hur du motionerar, så att du kan planera hur och när du kan sätta in nya motionspass. Du kan göra upp din plan tillsammans med hälsovården, en instruktör eller på egen hand.

Hur motionerar du i nuläget?

Hur och när skulle du vilja motionera?



PLANERING
HJÄLPER DIG
ATT LYCKAS.

Motionsdagbok

| VECKODAG | MOTIONSFORM ¹ | MÄNGD ² | RPE | ANDFÅDD ³ |
|----------|--------------------------|--------------------|-----|----------------------|
| måndag | | | | |
| tisdag | | | | |
| onsdag | | | | |
| torsdag | | | | |
| fredag | | | | |
| lördag | | | | |
| söndag | | | | |
| måndag | | | | |
| tisdag | | | | |
| onsdag | | | | |
| torsdag | | | | |
| fredag | | | | |
| lördag | | | | |
| söndag | | | | |

1 t.ex. trädgårdsarbete, stavgång, städning, träning på gym

2 tid / distans / antal steg

3 nej/lätt/kraftigt



FINLANDS
HJÄRTFÖRBUND

Läs om hjärthälsa och välmående,
bekanta dig med vår verksamhet
eller bli medlem

sydan.fi/sv/

Den här broschyren innehåller all-
männa råd om fysisk träning efter
en bypassoperation. Om du har fått
särskilda råd av din läkare eller din
fysioterapeut ska du följa dem.

Miljövänligt tryck. Broschyren har producerats i samarbete med:

